



聖德肋撒醫院
ST. TERESA'S HOSPITAL

口服抗血小板劑

亞士匹靈 (Aspirin)

及


氯格雷 (Clopidogrel)




藥物簡介

口服抗血小板劑可抑制血小板的凝集，防止有害血塊於血管內形成。常見用於預防心肌梗塞(冠心病)，中風或其他心血管疾病。

未服用抗血小板藥物



服用抗血小板藥物後



血小板互相結聚形成血栓



抗血小板藥物防止血小板結聚

亞士匹靈 (Aspirin)

用藥須知



- ① 雖然亞士匹靈為一種非醫生處方藥，但長期服用亦會有一定的風險，所以病人千萬不要在沒有醫生指示下服用亞士匹靈以預防心肌梗塞或腦中風。
- ② 有些時候，醫生會處方腸衣錠之亞士匹靈給你，它可以減低亞士匹靈對胃部所造成的刺激，但服用時必須把藥丸整粒用水吞服，而不可將藥丸咬碎或磨爛。
- ③ 請告知醫生所有有關你健康的資料，尤其是如果你患有：
 - 甲 貧血
 - 乙 胃潰瘍及其他胃部問題
 - 丙 哮喘，過敏，鼻息肉
 - 丁 腎病
 - 戊 肝病
 - 己 心臟病，高血壓
 - 庚 血友病或其他出血疾病



- 4 請通知你的醫生，牙醫及藥劑師，你正在服用亞士匹靈；尤其是當你需要接受手術，因為亞士匹靈會使凝血時間延長。通常須於手術前五天停服。
- 5 如果你對非類固醇消炎藥會產生過敏症狀，請告訴你的醫生或藥劑師，因為你亦可能會對亞士匹靈過敏。
- 6 胃潰瘍或出血是亞士匹靈較常見的副作用，所以服用亞士匹靈之病人，應儘量避免飲酒。
- 7 請告訴你的醫生如果你正在懷孕又或者計劃妊娠，你的醫生會與你討論在妊娠期間服用亞士匹靈可能存在的危險和好處。
- 8 如果你打算餵哺母乳，請與你的醫生討論，因為藥物有可能影響你的嬰兒。

若忘記服藥怎麼辦？

若忘記了服食一個劑量，要盡快補服忘記的劑量；但倘若已接近下一次服藥的時間，就不應補服，切勿服用雙倍藥量。



可能出現之副作用

- 1 過敏症狀，例如呼吸困難，面部或咀唇出現浮腫，身體出紅疹等。
- 2 腸胃不適，嚴重時可引致胃出血。
- 3 耳鳴。



藥物交互作用

亞士匹靈可能會與其他藥物(例如非類固醇消炎藥，薄血丸，肝素以及一些非醫生處方的藥物)產生交互作用，所以如果你正在服用其他藥物，請告知你的醫生或藥劑師。他們會說明在使用亞士匹靈時，需要小心服用或避免服用之藥物。如有需要，你的醫生可能會改變你服用的劑量又或改為服用另一種藥物。

藥物貯存及其他資訊

- 1 藥物應貯存在陰涼及乾燥的地方。
- 2 藥物要妥善貯存在兒童接觸不到的地方。
- 3 不要將藥物分給未經處方的人服食，亦不應用於治療其他病症。



氯格雷 (Clopidogrel)

用藥須知



- 1 氯格雷與亞士匹靈一樣，可防止血塊於血管中形成，以減少心肌梗塞及腦中風的機會。但另一方面它亦會增加身體出血的風險。所以必須在醫生的指示下才可服用此藥。
- 2 請告知醫生所有有關你健康的資料，尤其是如果你患有：
 - 甲 嚴重的肝臟疾病
 - 乙 胃潰瘍
 - 丙 有關出血的疾病或者血液凝固障礙

- 3 請通知你的醫生，牙醫及藥劑師，你正在服用氯格雷；尤其是當你需要接受手術，因為氯格雷會使凝血時間延長。通常須於手術前七天停服。
- 4 服用氯格雷後，你可能會比平日較難止血。如果你發現有出血異常的情況又或者出現血便或黑便，便應立即告訴你的醫生。
- 5 請告訴你的醫生如果你正在懷孕或者計劃妊娠，你的醫生會與你討論在妊娠期間服用氯格雷可能存在的危險和好處。
- 6 如果你打算餵哺母乳，請與你的醫生討論，因為藥物有可能影響你的嬰兒。



若忘記服藥怎麼辦？

若忘記了服食一個劑量，要盡快補服忘記的劑量；但倘若已接近下一次服藥的時間，就不應補服，切勿服用雙倍藥量。

可能出現之副作用

- 1 胃腸出血
- 2 紫癍，瘀血和鼻出血
- 3 血腫，血尿，眼部結膜出血
- 4 腹痛，消化不良，腹瀉和噁心
- 5 紅疹

藥物交互作用

氯格雷可能會與其他藥物(例如非類固醇消炎藥, 薄血丸, 肝素等)產生交互作用, 所以如果你正在服用其他藥物, 請告知你的醫生或藥劑師。他們會說明在使用氯格雷時, 需要小心服用或避免服用之藥物。如有需要, 你的醫生可能會改變你服用的劑量又或改為服用另一種藥物。



藥物貯存及其他資訊

- 1 藥物應貯存在陰涼及乾燥的地方。
- 2 藥物要妥善貯存在兒童接觸不到的地方。
- 3 不要將藥物分給未經處方的人服食, 亦不應用於治療其他病症。



常見問題

問題 1

口服抗血小板劑可用於預防心肌梗塞或腦中風等疾病, 那麼我是否可自行於藥房購買亞士匹靈或氯格雷服用?

答

雖然抗血小板劑可用於預防心肌梗塞或腦中風, 但亦會對身體造成一定程度的風險(尤其是出血), 所以你必須在醫生指示下才可服用抗血小板劑。

問題2

既然服用抗血小板劑會增加出血的風險，那麼我是否可以只靠控制飲食及改變生活習慣來預防血管栓塞，而不用服用抗血小板劑呢？

答

控制危險因素，例如膽固醇，血壓，戒煙等，只可以減慢血管粥樣硬化的過程，但如果你屬於高危人士，血管栓塞仍有機會發生。所以除非有特別原因，服用抗血小板劑仍然是必須的。

問題3

如果我將會接受手術，我是否需要停服亞士匹靈或氯格雷？

答

接受手術前，必須告訴你的醫生或牙醫你正在服用亞士匹靈或氯格雷，因為這些藥物可能會增加手術時出血的風險。而一般來說，須於手術前五天，停止服用亞士匹靈及於手術前七天，停止服用氯格雷。

問題4

如果我對某些止痛，消炎藥過敏，我是否適合服用亞士匹靈呢？

答

在接受任何治療前，你必須清楚告訴你的醫生或藥劑師你對那一種藥物過敏。如果你對非類固醇消炎藥過敏，你亦有可能會對亞士匹靈過敏。

問題5

如果我正在服用其他藥物，不知道是否會影響亞士匹靈或氯格雷的療效呢？

答

其實很多藥物會與亞士匹靈或氯格雷產生相互作用，而一些非醫生處方之止痛，消炎藥亦可能含有亞士匹靈，所以你必須告訴你的醫生或者藥劑師你正在服用的藥物。

問題6

如果我將會懷孕，那麼我是否仍適合服用抗血小板劑呢？

答

如果你正在服用抗血小板劑，而又將會懷孕，那麼你必須跟你醫生討論藥物對你或你的胎兒可能產生的影响。

問題7

在什麼情況下，會同時需要服用亞士匹靈及氯格雷呢？

答

如果你患有急性冠心病症候群又或需要進行心導管手術，便有可能需要同時服用亞士匹靈及氯格雷。因為經研究証實，對於上述病人如同時使用亞士匹靈或氯格雷，可更有效減低心肌梗塞，中風或心血管病的死亡率。

如對以上資料有任何疑問，可與本院藥劑師聯絡

電話: 2200 3106

聖德肋撒醫院藥劑部印

2005年12月 第一版



聖德肋撒醫院
ST. TERESA'S HOSPITAL

香港九龍太子道三二七號

電話：(852) 2200 3434

傳真：(852) 2711 9779

電郵：sth@sth.org.hk