

本中心其他服務包括

- 幼針管抽取活組織檢驗
- 乳房組織穿刺檢查
- 俯臥式乳房立體定位組織穿刺檢查
- 乳房腫瘤切除手術
- 保留乳房治療術
- 改良根治性乳房切除手術
- 前哨淋巴結活檢術
- 腋下淋巴切除手術
- 化學治療、標靶治療
- 本中心另設有多項乳房檢查或治療服務，詳情請查看本院網站

參考資料: www.21.ha.org.hk/smartpatient

生效日期: 二零二二年三月

PFE-EPI-1-C011



電話: (852) 22003434

網址: www.sth.org.hk

- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
- ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
- ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道口
- ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分鐘到達
- 東鐵
- ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
- ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

乳房膿瘡切開 及引流手術

Examination Information

程序簡介



乳房膿瘡切開及引流手術



乳腺診斷治療中心

聖德肋撒醫院 北座一樓

電話:(852) 2200 3310

辦公時間: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

簡介

乳房膿腫是膿液積聚於乳腺組織內引起的急性炎症和感染，常見於分娩後哺乳期的乳房。其主要症狀包括發紅、發熱、炎症、腫脹、硬化、壓痛和疼痛。如不及時治療，皮膚會變暗，最終膿腫破裂。

術前準備

- 需簽署手術同意書

- 請告知醫生任何藥物過敏史，常規藥物治療或病況
- 依指示停用薄血藥，避免服用容易導致出血的中藥
- 請依指示入院
- 手術前須禁食六小時
- 手術前須排尿清空膀胱
- 入院前請洗掉指甲油、脫下飾物及假牙
- 可能需要注射或口服抗生素預防

手術過程

- 手術在局部麻醉情況下進行
- 手術過程大概半小時
- 利用刀片在膿腫皮膚上切割，進入膿腔，讓膿液排出，並用紗布吸收膿液和血液
- 使用合適紗布條，填補膿腔
- 用紗布敷料覆蓋傷口

術後護理

- 切勿除去傷口上面紗布
- 可照常沐浴但應要保持傷口乾爽

- 一般情況下傷口需要每天清洗及更換敷料
- 可照常飲食及活動
- 請依照醫生處方服食止痛藥

麻醉併發症

- ※ 即使屬罕見情況，但局部麻醉藥有可能會導致嚴重併發症

手術併發症

- ※ 傷口血腫和感染，但屬罕見情況
- ※ 如膿腫範圍大，術後可能會造成乳房畸形

* 如有查詢，請與本中心或你的醫生聯絡

聖德肋撒醫院, 太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk