

可能出現的併發症：

其實支氣管內視鏡檢查是一個安全的檢查，在檢查過程中可能引起的併發症：

- ◇ 輕微氣胸(1%，可自行消失)
- ◇ 輕微咳血
- ◇ 輕微發燒或縱隔發炎(少於1%)
- ◇ 嚴重氣胸(0.5%，需要引流治療)
- ◇ 嚴重咳血(0.2%)
- ◇ 死亡危機，少於0.1%

如有心肺功能不良、高齡、腎衰竭等病者，危險會增加。

*以上資訊只供參考，並不能完全反映醫生意見，如有疑問應諮詢你的醫生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-C013



- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分鐘到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

支氣管內視鏡檢查

Health Information

健康資訊

支氣管內視鏡檢查

是一個診斷及治療胸肺疾病的常見方法，支氣管內視鏡檢查的原因包括：

- 原因不明的呼吸系統病的病徵，例如：持續性咳嗽或咳血、聲線改變。
- 肺部 X 光片顯示有異常，需作進一步檢查。
- 異物誤入氣管。
- 持續性肺部感染。
- 濃痰積聚而導致肺陷落。

檢查過程：

- 1) 病人喉部先被噴上局部麻醉藥，然後注射適量的鎮靜劑
- 2) 醫生會用一條約五毫米粗的軟管從病人的口腔，經過咽喉進入氣管，直接觀察及檢查氣管及支氣管。
- 3) 醫護人員會嚴密觀察你的生命表徵、血壓、脈搏和血氧飽和量等，有需要時會給予額外氧氣。

- 4) 如有需要，醫生會按需要而抽取肺部的分泌，進行幼針穿刺或抽取少量氣管或肺部組織作進一步化驗。
- 5) 檢查期間，病人或會咳嗽，此乃正常反應，應盡量放鬆，如常呼吸，則有助檢查順利進行。
- 6) 一般來說，整個內視鏡檢查需時 30-60 分鐘，在一些複雜的個案，所需之時間將會更長。

檢查前準備：

- ※ 作有關的血液化驗或肺功能測試。
- ※ 照肺部 X 光片或電腦掃描。
- ※ 病人須於內視鏡檢查前六小時禁食。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血壓或懷孕等，須告訴醫護人員並聽從其指示服藥。
- ※ 病人亦應提供現所服用藥物及任何過敏反應資料。

- ※ 門診病人不宜親自駕駛前來；應避免在檢查前酗酒、抽煙或服用不當份量的鎮靜藥物。年老、行動不便的病人宜由家人陪伴前來檢查。

檢查後注意事項：

- ※ 因喉部曾接受局部麻醉噴劑，病人檢查後尚須禁食兩小時，以待喉部麻醉藥或鎮靜劑藥力減退後才可進食。
- ※ 病人於檢查後，或會接受 X 光檢查。
- ※ 檢查後會有輕微喉痛、聲嘶及痰液有少量血絲。
- ※ 病人接受鎮靜劑注射後會有頭暈感覺，應臥床休息，待藥力過後才可起床走動；並整天不可操作重型機器或駕駛，以防意外發生。
- ※ 病人應主動查詢檢查結果及日後覆診日期，並依照醫護人員指示完成藥物療程。