

可能出現的併發症：

較嚴重之併發症包括：

- ◇ 腸道穿孔
- ◇ 出血
- ◇ 心肺併發症
- ◇ 感染及急性腸閉塞等

一般來說機會少於百份之一。

病人如要接受內鏡治療，如息肉切除、內鏡止血、擴張及支架放置等則出現嚴重併發症之機會亦大幅提高。

如併發症出現，病人或需接受外科手術治療，嚴重者可導致病人死亡。各併發症發生之機會隨著病人不同之情況及治療方法而有異，病人應主動詢問主診醫生以明瞭詳情。

*以上資訊只供參考，並不能完全反映醫生意見，如有疑問應諮詢你的醫生。


Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-C011



- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分鐘到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院



結腸內視鏡(大腸鏡) 檢查

Health Information

健康資訊

結腸內視鏡檢查

俗稱大腸鏡檢查，為應用先進光學儀器診斷下腔消化道，包括迴腸末端、盲腸、結腸各部位、直腸及肛門疾病的最佳方法。

病人懷疑患有大腸疾病如癌症、出血或大便帶隱血、大便習慣改變、長期肚瀉或便秘、排便困難等情況均應接受大腸鏡檢查。

比較傳統X光檢查，大腸鏡檢查除能更準確發現致病原因，並能同時通過各種輔助儀器，對病源作活鉗樣本化驗及進行治療。

檢查過程：

- 1) 醫生先給病人注射適量的鎮靜劑，此能減低病人的焦慮及檢查時所引起之不適。
- 2) 醫生隨著將一支柔軟，直徑約為1.5公分之內視鏡由病人肛門放進體內進行檢查。

- 3) 視乎病人個別情況，一般來說，整個檢查需時約30分鐘。在一些複雜的個案而需要特別治療者，所需之時間將會更長。
- 4) 檢查期間病人多感到腹部氣脹及輕度不適。

檢查前準備：

- ※ 在檢查前，病人必須先服用強力清瀉藥水以將大腸內之大便全部排出，使醫生能更準確地觀察大腸壁之病變。如病人未能完成放瀉程序，即清瀉藥或水份不足，則有礙檢查進行，如服用過量，則會引致電解物不平衡，嘔吐，肚痛或有水腫情況出現。因此請依照醫護人員指示完成藥物療程。

- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血壓或懷孕等，須告訴醫護人員並聽從其指示服藥。
- ※ 病人亦應提供現在所服用的藥物及任何過敏反應資料。
- ※ 門診病人不宜親自駕駛前來；亦應避免在檢查前酗酒、抽煙或服用不當份量的鎮靜藥物。年老、行動不便等病人宜由家人陪伴。

檢查後注意事項：

- ※ 病人接受鎮靜劑注射後會有頭暈感覺，應臥床休息，待藥力過後才可起床走動進食；並整天不可操作重型機器或駕駛，以防意外發生。
- ※ 病人應主動查詢檢查結果及日後覆診日期，並依照醫護人員指示完成藥物療程。