

可能出現的併發症：

- ◇ 主要是小便疼痛、帶血或發炎。
- ◇ 有時血塊停滯於膀胱內引致排尿困難。
- ◇ 尿道狹窄乃長期後遺症。
- ◇ 膀胱穿孔、尿道受損或敗血病則較為罕見。

一般來說機會少於百份之十。如出現併發症，病人或需接受外科手術補救，嚴重者可導致病人死亡。各併發症發生之機會隨著病人不同之情況、及治療方法而有所差異，病人應主動詢問主診醫生以明瞭詳情。

*以上資訊只供參考，並不能完峻反映醫生意見，如有疑問應諮詢你的醫生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-C014



- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

軟性膀胱內視鏡檢查

Health Information

健康資訊

引言：

軟性膀胱鏡檢查是用內窺鏡經尿道進入膀胱內，從而清楚看見尿道、膀胱、輸尿管入口等是否正常。

適應症：

一般由尿道及膀胱所引發的不適症。

檢查過程：

- 1) 病人平臥或需掛起雙腳。
- 2) 用帶有麻醉成份的潤滑劑注射入尿道。
- 3) 將軟性膀胱鏡經尿道進入膀胱。
- 4) 膀胱會有脹滿的感覺。
- 5) 如有需要，會抽取組織檢查或清洗膀胱等手術。
- 6) 通常檢查需時十至十五分鐘。

檢查前準備：

- ※ 可正常飲食。
- ※ 將小便排清，使醫生能清楚看見膀胱內之情況。

檢查後注意事項：

- ※ 可正常飲食並多飲開水，以減少發炎機會。
- ※ 小便可能有少許疼痛或小便帶血，此情況會逐漸減退。
- ※ 通常即日便可出院。
- ※ 最重要是多飲開水，每天飲水須多於2公升，但不要過量。

.....