

## 可能出現的併發症：

其實支氣管超聲波內視鏡檢查是一個安全的檢查，在檢查過程中可能引起的併發症：

- ◇ 輕微氣胸(1%，可自行消失)
- ◇ 輕微咳血
- ◇ 輕微發燒或縱膈發炎(少於1%)
- ◇ 嚴重氣胸(0.5%，需要引流治療)
- ◇ 嚴重咳血(0.2%)
- ◇ 死亡危機，少於0.1%

如有心肺功能不良、高齡、腎衰竭等病者，危險會增加。

\*以上資訊只供參考，並不能完全反映醫生意見，如有疑问應諮詢你的醫生。

Reference: Hospital Authority  
October 2021 (Reviewed)  
PFE-EPI-9-C015



- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線：2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士：1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
  - ※ 樂富：可換乘的士約五分鐘到達
  - ※ 旺角：可換乘非專線小巴至露明道口
  - ※ 宋皇台：B1 出口，可步行 5-10 分鐘到達
- 東鐵
  - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
  - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士：(852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital  
聖德肋撒醫院

## 支氣管超聲波內視鏡 檢查

Health Information

健康資訊

## 引言：

支氣管超聲波內視鏡檢查為應用先進內視鏡儀器診斷及治療胸肺疾病的常見方法，檢查的原因包括：縱隔腫塊或淋巴結、肺癌的分期及原因不明的呼吸系統病，但支氣管鏡檢查找不出原因。

## 檢查過程：

- 1) 病人喉部先被噴上局部麻醉藥，然後注射適量的鎮靜劑。
- 2) 醫生會用一條約六毫米粗的軟管從病人的口腔，經過咽喉進入氣管，直接觀察及檢查氣管及支氣管。
- 3) 醫護人員會嚴密觀察你的生命表徵、血壓、脈搏和血氧飽和量等，有需要時會給予額外氧氣。
- 4) 如有需要，醫生會按需要而抽取肺部的分泌，進行幼針穿刺或抽取少量氣管或肺部組織作進一步化驗。

- 5) 檢查期間，病人或會咳嗽，此乃正常反應，應盡量放鬆，如常呼吸，則有助檢查順利進行。
- 6) 一般來說，整個內視鏡檢查需時30-60分鐘，在一些複雜的個案，所需之時間將會更長。

## 檢查前準備：

- ※ 作有關的血液化驗或肺功能測試。
- ※ 照肺部 X 光片或電腦掃描。
- ※ 病人須於內視鏡檢查前六小時禁食。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血壓或懷孕等，須告訴醫護人員並聽從其指示服藥。
- ※ 病人亦應提供現所服用藥物及任何過敏反應資料。

- ※ 門診病人不宜親自駕駛前來；應避免在檢查前酗酒、抽煙或服用不當份量的鎮靜藥物。年老、行動不便的病人宜由家人陪伴前來檢查。

## 檢查後注意事項：

- ※ 因喉部曾接受局部麻醉噴劑，病人檢查後尚須禁食兩小時，以待喉部麻醉藥或鎮靜劑藥力減退後才可進食。
- ※ 病人於檢查後，或會接受 X 光檢查。
- ※ 檢查後會有輕微喉痛、聲嘶及痰液有少量血絲。
- ※ 病人接受鎮靜劑注射後會有頭暈感覺，應臥床休息，待藥力過後才可起床走動；並整天不可操作重型機器或駕駛，以防意外發生。
- ※ 病人應主動查詢檢查結果及日後覆診日期，並依照醫護人員指示完成藥物療程。