

可能出現的併發症：

較嚴重之併發症包括：

- ◇ 腸道穿孔
- ◇ 出血
- ◇ 心肺併發症
- ◇ 急性膽管炎及胰腺炎等

一般來說機會少於百份之五。如出現併發症，病人或需接受外科手術補救，嚴重者可導致病人死亡。

各併發症發生之機會隨著病人不同之情況及治療方法而有所差異，病人應主動詢問主診醫生以明瞭詳情。

*以上資訊只供參考，並不能完全反映醫生意見，如有疑問應諮詢你的醫生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-C012




電話: (852) 22003434

網址: www.sth.org.hk

- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院



內視鏡逆行胰膽管 造影術

Health Information

健康資訊

內視鏡逆行胰膽管造影術

胰臟及膽管為深藏體內之重要器官。胰管匯集從胰臟分泌出之消化液，而膽管則負責將從肝臟製造之膽汁引流到小腸，兩者經會合後，將一同被排進十二指腸。

對胰臟及膽管之疾病，一般體外所作之檢查並未能準確得出答案。使用內視鏡逆行胰膽管造影術，俗稱膽管鏡檢查，醫生能從十二指腸膽管開口處，逆方向地將導管放進胰管或膽管進行X光造形顯影。

病人懷疑患有胰膽管閉塞(如因結石或腫瘤)、急性膽管炎、急性或慢性胰腺炎、手術後胰膽管滲漏等，膽管鏡檢查均能準確作出診斷，醫生並能同時使用各類輔助儀器治療胰膽管中之疾病。

檢查過程：

- 1) 醫生先給病人喉部噴上局部麻醉藥，然後注射適量的鎮靜劑。
- 2) 醫生隨著將一支柔軟，直徑約為1.3公分之內視鏡經口部放進病人十二指腸部位進行檢查及治療。
- 3) 視乎病人個別情況，一般來說，整個內視鏡檢查需時約30-60分鐘。
- 4) 在一些複雜的個案而需要特別治療者，所需之時間將會更長。
- 5) 檢查期間病人多感到噁心及上腹膨脹不適。

檢查前準備：

- ※ 病人須於膽管鏡檢查前六小時禁食。但對於一些病況危急的病人，則或需要緊急施行。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血壓或懷孕等，須告訴醫護人員並聽從其指示服藥。

- ※ 病人亦應提供現所服用藥物及任何過敏反應資料。
- ※ 門診病人不宜親自駕駛前來；亦應避免在檢查前酗酒、抽煙或服用不當份量的鎮靜藥物。年老、行動不便的病人宜由家人陪伴前來檢查。

檢查後注意事項：

- ※ 病人檢查後待麻醉藥或鎮靜劑藥力減退後需按醫囑進食。
- ※ 病人如需要使用鼻膽管引流，則須小心保持其位置以防治療失效。
- ※ 病人應主動查詢檢查結果及日後覆診日期，並依照醫護人員指示完成藥物療程。