

可能出現的併發症：

較嚴重之併發症包括：

- ◇ 腸道穿孔
- ◇ 出血
- ◇ 胰臟發炎(如需作胰臟幼針穿刺)
- ◇ 心肺併發症及感染等

一般來說機會少於百份之一。各併發症發生之機會隨著病人不同之情況、檢驗及治療方法而有所差異，病人應主動詢問主診醫生以明瞭詳情。如出現併發症，病人或需接受外科手術補救，嚴重者可導致病人死亡。

*以上資訊只供參考，並不能完全反映醫生意見，如有疑問應諮詢你的醫生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-C016



- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

超聲波內視鏡檢查

Health Information

健康資訊

引言：

超聲波內視鏡檢查，為應用先進內視鏡儀器診斷上腔消化道，以及縱隔腔、肝、膽管、胰臟的最佳方法。病人患有上消化道疾病、肝膽胰病變，以及縱隔腔疾病等情況，均應接受超聲波內視鏡檢查。

比較傳統X光檢查和體外超聲波，超聲波內視鏡檢查除能更準確發現致病原因，並能同時通過各種輔助儀器，對病源作幼針穿刺、活鉗樣本化驗及進行治療。

檢查過程：

- 1) 病人喉部先被噴上局部麻醉藥，然後注射適量的鎮靜劑。
- 2) 醫生隨著將一支柔軟，直徑約為1.1-1.3公分之超聲波內視鏡經口部(檢查骨盆腔或大腸病者會經肛門)放進病人體內進行檢查。

- 3) 一般來說，整個內視鏡檢查需時約 20-30 分鐘。在一些複雜的個案而需要特別治療者，所需之時間將會更長。
- 4) 檢查期間病人多感到噁心及上腹膨脹不適。

檢查前準備：

- ※ 病人須於內視鏡檢查前六小時禁食。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血壓或懷孕等，須告訴醫護人員並聽從其指示服藥。
- ※ 病人亦應提供現所服用藥物及任何過敏反應資料。
- ※ 門診病人不宜親自駕駛前來；亦應避免在檢查前酗酒、抽煙或服用不當份量的鎮靜藥物。年老、行動不便的病人宜由家人陪伴前來檢查。

檢查後注意事項：

- ※ 因喉部曾接受局部麻醉噴劑，病人檢查後尚須禁食一小時，以待喉部麻醉藥或鎮靜劑藥力減退後才可進食。
- ※ 病人接受鎮靜劑注射後會有頭暈感覺，應臥床休息，待藥力過後才可起床走動。並整天不可操作重型機器或駕駛，以防意外發生。
- ※ 病人應主動查詢檢查結果及日後覆診日期，並依照醫護人員指示完成藥物療程。