

聖德肋撒醫院  
眼科中心

病人須知  
螢光造影或靛花青眼底血管造影

**簡介**

螢光造影或靛花青眼底血管造影是用作檢查視網膜(眼底)血管狀況，並不是手術。將螢光素或靛花青作靜脈注射後，透過血液循環，將眼底血管顯現以助醫生作出更準確的診斷及治療。

**注意事項：**

1. 孕婦不宜作此項檢查。
2. 螢光素或靛花青可能引致敏感反應，輕微的會有噁心、嘔吐或出疹現象。嚴重的藥物反應比較罕見，因此病人如對食物或藥物有過敏反應，請通知醫生，以作出相應的安排。檢查當日，請依時攜同家人或朋友陪同下作檢查準備。

**檢查前：**

1. 可如常進食，無須禁食。
2. 需將眼瞳孔擴張才進行檢查。

**檢查時：**

1. 造影劑須經靜脈注射進入血管，連接閃光燈之眼底攝影機會攝取一連串之相片，需時通常不超過十五分鐘檢查完成。

**檢查完成後：**

1. 若病人稍作休息後並無不妥，即可在家人陪同下回家。
2. 由於曾使用擴瞳眼藥水，視力會短暫模糊，所以不宜駕駛。可佩戴太陽眼鏡以減輕畏光現象。
3. 因螢光劑會隨尿液排出體外，所以檢查後 24-36 小時內小便會呈橙黃色，宜多喝開水。
4. 皮膚及結膜即眼白亦可能發黃跡象，但會在 6-12 小時後消失，毋須驚慌。

請\_\_\_\_\_於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_午\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分  
到\_\_\_\_\_約見\_\_\_\_\_醫生覆診

參考資料

1. 醫院管理局- 智友站 Retrieve, 2012 from <http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/EYE-10.pdf>

STHEC

Revised on Oct 2022